



DR. MOLINA

Cirugía Bucal, Maxilofacial e Implantología


IMPLANTES


CIGOMATICOS

PARA UNA SONRISA PERFECTA

una alternativa única

para pacientes con con grandes pérdidas de hueso





USTED TIENE INSUFICIENTE HUESO PARA COLOCAR IMPLANTES?

Un adecuado volumen óseo es necesario para poder colocar implantes. El maxilar superior ha sido tradicionalmente una de las áreas más difíciles para la colocación de implantes debido a la insuficiente cantidad y calidad del hueso, y la proximidad con el seno maxilar que es un área anatómica de importancia. Si usted ha perdido hueso en esta área debido a razones tales como enfermedad periodontal, Extracciones dentales antiguas o traumáticas, usted puede ser candidato para técnicas complementarias a la cirugía de implantes. Una elevación de piso de seno maxilar o la colocación de un IMPLANTE CIGOMÁTICO pueden corregir este problema.

LEVANTAMIENTO DE SENO

El objetivo de este procedimiento es elevar el piso para poder lograr formar nuevo hueso en esa zona y así colocar implantes. Varias técnicas pueden ser usadas. Dependiendo de cada caso, generalmente es necesario utilizar injertos de hueso del propio paciente donde se produce otra zona quirúrgica, o hueso de banco; siendo estos injertos poco predecibles por su alta tasa de reabsorción. Luego se deben esperar aproximadamente 8 a 12 meses para poder colocar implantes en esa zona. Luego de colocados, otros 4 meses hay que esperar para que estos se oseointegren. En otros casos los implantes pueden ser colocados al mismo tiempo que la elevación de seno, Aunque solo en casos donde no sea necesaria grandes elevaciones.

IMPLANTES CIGOMÁTICOS

El desarrollo de los implantes cigomáticos presentan una alternativa única para la rehabilitación total o unilateral del maxilar severamente atrófico, mediante un solo procedimiento quirúrgico y sin la necesidad de utilización de injertos óseos. Los largos implantes son anclados en el maxilar superior y en el denso cigoma. Una prótesis temporaria puede ser colocada inmediatamente luego de poner los implantes hasta la restauración final. La ventaja principal de estos sobre el levantamiento de seno es la corta duración de los tratamientos, la tasa de éxito que alcanza un 95% luego de 10 años según estudios científicos. Si usted es un paciente disconforme con su prótesis superior removible, o si es candidato a un levantamiento de seno maxilar, debería de considerar esta opción, ya que solo los implantes cigomáticos serán capaces de devolverle esa sonrisa que usted siempre quiso en tan poco tiempo. Y recuerde... Solo Cirujanos maxilofaciales pueden colocar estos implantes.